

Stochastik I

1. Übung

Aufgabe 1 (6 Punkte) Sei Ω eine abzählbar-unendliche Menge. Betrachten Sie das Mengensystem

$$\mathcal{A} = \{A \subset \Omega : A \text{ ist endlich oder } A^c \text{ ist endlich}\}$$

und die Abbildung

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & , \text{ falls } A \text{ endlich} \\ 1 & , \text{ falls } A^c \text{ endlich} \end{cases} \quad (A \in \mathcal{A}).$$

- (i) Zeigen Sie, dass \mathcal{A} ein Ring ist.
- (ii) Untersuchen Sie ob μ ein Inhalt bzw. ein Prämaß ist.

Aufgabe 2 (5 Punkte) Sei Ω eine nichtleere Menge. Für beliebige Teilmengen $A, B \subset \Omega$ bezeichnen wir die Menge

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

als *symmetrische Differenz* von A und B .

Zeigen Sie: Ein Mengensystem $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ ist genau dann ein Ring (im Sinne von Definition 2.9), wenn \mathcal{A} mit den Verknüpfungen Δ als Addition und \cap als Multiplikation einen kommutativen Ring (im Sinne der Algebra) bildet.

Aufgabe 3 (6 Punkte) Es sei Ω eine nichtleere Menge, $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ ein Ring und μ ein Prämaß auf \mathcal{A} . Zeigen Sie die folgenden Eigenschaften des Prämaßes μ :

- (i) *Endliche Additivität*: Für disjunkte $A, B \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

- (ii) Für $A, B \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Unter welcher Voraussetzung kann man dies zu

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

umstellen?

(iii) *Monotonie*: Für $A, B \in \mathcal{A}$ gilt

$$A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B).$$

(iv) *Sub- σ -Additivität*: Für $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ mit $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, gilt

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$