



Übungen zur Vorlesung  
Minimalflächen  
Wintersemester 2018/19

Blatt 1

Besprechung: 09.11.2018

Übung 1.

Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  eine offen, beschränkte Menge mit glattem Rand. Man beweise mit dem Satz von Gauß:

$$\int_{\Omega} \Delta u \eta \, d\lambda = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \eta \, d\lambda$$

für alle  $u \in C^2(\overline{\Omega})$  und  $\eta \in C_c^1(\Omega)$ , wobei  $\lambda$  das Lebesguemaß und  $\Delta = \sum_{i=1}^n \partial_{ii}$  den Laplaceoperator bezeichnet.

Übung 2.

Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  eine offen, beschränkte Menge mit glattem Rand. Definiere

$$J: C^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla f|^2} \, d\lambda.$$

Seien weiterhin  $f \in C^1(\Omega)$  und  $\psi \in C_c^1(\Omega)$  so, dass mit

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varepsilon \mapsto J(f + \varepsilon\psi)$$

die Bedingung

$$g'(0) = 0$$

gilt. Zeigen Sie:

$$(i) \int_{\Omega} (1 + |\nabla f|^2)^{-1/2} \nabla f \cdot \nabla \psi \, d\lambda = 0,$$

$$(ii) \operatorname{div} \left( \frac{\nabla f}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \right) = 0.$$

(Hinweis : Benutzen Sie den Satz von Gauß.)

Übung 3.

Finden Sie alle Lösungen der Minimalflächengleichung

$$(1 + (\partial_2 f)^2) \partial_{11} f - \partial_1 f \partial_2 f \partial_{12} f + (1 + (\partial_1 f)^2) \partial_{22} f = 0,$$

die die Gestalt  $f(u, v) = \varphi(u) + \psi(v)$  haben und  $f(0, 0) = 0$  sowie  $\partial_1 f(0, 0) = \partial_2 f(0, 0) = 0$  erfüllen. Die Fläche heißt *erste Scherk-Fläche*. Zeigen Sie dazu zunächst, dass  $\varphi'$  und  $\psi'$  Lösungen der gewöhnlichen Differentialgleichung

$$\lambda' = c(1 + \lambda^2) \quad (c \in \mathbb{R})$$

sind.