Übungen zur Vorlesung Analysis II
Sommersemester 2006

Blatt 3

Abgabe: Mittwoch, 10.05.2006 von 11.00 bis 11.10 Uhr in HS III, Gebäude E2 5 oder bis 11.10 Uhr in den Briefkasten 'Analysis II SS 06' in Gebäude E2 5 (Untergeschoss)

Aufgabe 1 (Zustandsgleichung idealer Gase) (4 Punkte)

Für ein ideales Gas mit Druck P , Volumen V und absoluter Temperatur T gilt die Zustandsgleichung

$$PV = cT,$$

wobei c eine Konstante ist. Zeigen Sie, dass für ein solches Gas die Beziehung

$$\frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial V} = -1$$

besteht.

Aufgabe 2 ((3+3)+(4+4)=14 Punkte)

(a) Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung der folgenden Funktionen:

(i) $f(x, y) := x^3 - 2x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 + 10.$

(ii) $f(x, y, z) := xyz \sin(x + y + z).$

(b) Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ offen, $v \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ und $f, g \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass gilt

(i) $\operatorname{div}(\operatorname{rot} v) = 0.$

(ii) $\Delta(fg) = f\Delta g + 2\nabla f \nabla g + g\Delta f.$

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Sei die Funktion f definiert durch

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zeigen Sie, dass f zweimal partiell differenzierbar ist auf ganz $\mathbb{R}^2$, aber $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$ gilt. Ist f stetig auf $\mathbb{R}^2$?

Bitte wenden!

Aufgabe 4**(5+7=12 Punkte)**

Mit $\text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ sei der $\mathbb{R}$ -Vektorraum der $(M \times N)$ -Matrizen über $\mathbb{R}$ bezeichnet. Zeigen Sie:

(a) Durch

$$\|A\| := \sup\{|A \cdot x|; x \in \mathbb{R}^N, |x| \leq 1\} \quad (A \in \text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R}))$$

(wobei $|\cdot|$ die euklidische Norm auf $\mathbb{R}^N$ bzw. $\mathbb{R}^M$ bezeichnet) wird eine Norm auf $\text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ definiert. Sind $A \in \text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ und $B \in \text{Mat}_{N \times R}(\mathbb{R})$, dann gilt

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

(b) Durch

$$\|A\|_2 := \left(\sum_{\substack{i=1, \dots, M \\ j=1, \dots, N}} a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (A \in \text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R}))$$

wird eine Norm auf $\text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ definiert. Sind $A \in \text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ und $B \in \text{Mat}_{N \times R}(\mathbb{R})$, dann gilt $\|A \cdot B\|_2 \leq \|A\|_2 \cdot \|B\|_2$. Zeigen Sie, dass die Abschätzung

$$\|A\| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{N} \|A\|$$

für alle $A \in \text{Mat}_{M \times N}(\mathbb{R})$ gilt.

Aufgabe 5* (Wiederholung zur Analysis I)**((2+2)+5=9 Punkte)**

(a) Berechnen Sie die Ableitung von

$$(i) f(x) = \int_0^{x^2} e^{-u^2} du.$$

$$(ii) f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} u^3 du.$$

(b) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und seien $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$$

differenzierbar ist und berechnen Sie die Ableitung F' von F .

Informationen zu den Übungsgruppen

- Eine Anmeldung zu den Übungsgruppen ist nur noch bis 05.05.2006 möglich!
- Die Übungsblätter finden Sie auch im Netz unter

www.math.uni-sb.de/~ag-albrecht/ss06/ana2/ana2.html