Übungen zur Vorlesung Analysis II
Sommersemester 2006

Blatt 4

Abgabe: Mittwoch, 17.05.2006 von 11.00 bis 11.10 Uhr in HS III, Gebäude E2 5 oder bis 11.10 Uhr in den Briefkasten 'Analysis II SS 06' in Gebäude E2 5 (Untergeschoss)

Aufgabe 1

((3+3)+4=10 Punkte)

- (a) Berechnen Sie die Richtungsableitung der folgenden Funktionen in den angegebenen Punkten a in Richtung der angegebenen Vektoren u :

(i) $f(x, y) := x^2 + y^2$, $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

(ii) $f(x, y, z) := x^2 + ze^y$, $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

- (b) Berechnen Sie die Jacobimatrix J_f der Funktion

$$f(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z)) = (z^2 e^{xy}, xy e^{2yz}).$$

Aufgabe 2

(10 Punkte)

Untersuchen Sie die folgende Funktion auf partielle und totale Differenzierbarkeit

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \sqrt{|xy|}.$$

Aufgabe 3

(5+5=10 Punkte)

Berechnen Sie die Jacobimatrizen und deren Determinante der folgenden Abbildungen in jedem Punkt des jeweiligen Definitionsbereiches

(i) $k : (0, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$.

(ii) $z : (0, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(r, \theta, z) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$.

Aufgabe 4

(5+5=10 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass der Durchschnitt beliebig vieler konvexer Mengen wieder konvex ist.
- (b) Sei Ω eine offene, konvexe Teilmenge des $\mathbb{R}^n$. Besitzt $f \in C^1(\Omega)$ in Ω beschränkte partielle Ableitungen, so ist f Lipschitz-stetig in Ω .
-

Bitte wenden!

Aufgabe 5***(8 Punkte)**

Sei $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ und $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen und konvex. Zeigen Sie die folgende Aussage:

Ist $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine total differenzierbare Abbildung mit $J_f(x) = A$ für alle $x \in \Omega$, so gibt es ein $b \in \mathbb{R}^m$ mit $f(x) = Ax + b$ für alle $x \in \Omega$.

Die Übungsblätter finden Sie auch im Netz unter

www.math.uni-sb.de/~ag-albrecht/ss06/ana2/ana2.html