Mathematik für Studierende der Biologie und des Lehramts Chemie
(WS 2006/07)
Lösungen zu Blatt 1

Aufgabe 1. (a) Schreiben Sie mit Hilfe des Summenzeichens $\sum$ bzw. des Produktzeichens $\prod$ die Ausdrücke

(i) $2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18$

(ii) $1 - 3 + 9 - 27 + 81$

(iii) $2006!$.

(b) Berechnen Sie

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

mit Hilfe des binomischen Satzes.

Lösung: (a) Es gilt für (i):

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 = \sum_{n=1}^9 2n,$$

für (ii):

$$1 - 3 + 9 - 27 + 81 = \sum_{n=0}^4 (-3)^n$$

und für (iii):

$$2006! = \prod_{n=1}^{2006} n.$$

(b) Nach dem binomischen Satz gilt für alle $a, b \in \mathbb{R}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Wählen wir speziell $a = b = 1$, so folgt:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

□

Aufgabe 2. Geben Sie alle reellen Lösungen der folgenden Gleichungen an:

(a) $2x^2 - 8x + 6 = 0$,

(b) $x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = 0$,

(c) $x^2 + 2x + 2 = 0$.

Lösung: (a) Die angegebene Gleichung ist äquivalent zu der Gleichung $x^2 - 4x + 3 = 0$ mit den beiden Lösungen $x_1 = 2 + \sqrt{2^2 - 3} = 3$ und $x_2 = 2 - \sqrt{2^2 - 3} = 1$.

(b) Durch Einsetzen sieht man, daß $x_1 = 3$ eine Lösung der Gleichung ist. Durch Polynomdivision rechnet man nach:

$$\begin{array}{r}
x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = x^2 + 7x + 12 \\
x^3 - 3x^2 \\
\hline
7x^2 - 9x \\
7x^2 - 21x \\
\hline
12x - 36 \\
12x - 36 \\
\hline
0
\end{array}$$

Es gilt also $x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = (x - 3)(x^2 + 7x + 12)$. Für die noch zu berechnenden Nullstellen von $x^2 + 7x + 12$ erhalten wir

$$x_{2/3} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} - 12},$$

d.h. $x_2 = -3$ und $x_3 = -4$. Die Lösungen der Gleichung sind also: $x_1 = 3$, $x_2 = -3$, $x_3 = -4$. Da ein Polynom vom Grad 3 höchstens 3 Lösungen haben kann, sind dies alle Lösungen.

(c) Die angegebene Gleichung ist äquivalent zu $(x + 1)^2 = -1$ hat also keine reellen Lösungen, da das Quadrat einer reellen Zahl nicht negativ sein kann.

Aufgabe 3. Lösen Sie die folgenden Differenzgleichungen

- (a) $x_{n+2} = 4x_{n+1} - 3x_n$,
- (b) $x_{n+2} = 4x_{n+1} - 4x_n$.

Lösung: (a) Die Differenzgleichung schreiben wir in ihrer Normalform

$$x_{n+2} - 4x_{n+1} + 3x_n = 0.$$

Die zugehörige charakteristische Gleichung lautet also:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3\lambda = 0.$$

Sie hat die Lösungen $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = 1$. Gemäß Satz 1.4 der Vorlesung ist die Lösungsgesamtheit $\mathbb{L}$ der gegebenen Differenzgleichung also gegeben durch

$$\mathbb{L} = \{(\alpha 3^n + \beta 1^n)_{n=0}^\infty; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha 3^n + \beta)_{n=0}^\infty; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

(b) Die Differenzgleichung lautet in Normalform

$$x_{n+2} - 4x_{n+1} + 4x_n = 0.$$

Die zugehörige charakteristische Gleichung

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

hat die doppelte reelle Lösung $\lambda = 2$. Nach Satz 1.4 der Vorlesung ist also die Lösungsgesamtheit der gegebenen Differenzgleichung gegeben durch:

$$\mathbb{L} = \{(\alpha 2^n + \beta n 2^n)_{n=0}^\infty; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

□

Aufgabe 4. Wieviele Fachkombinationen mit zwei unterschiedlichen Fächern gibt es für das Lehramtsstudium, wenn 20 Fächer insgesamt angeboten werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung: Nach Satz 0.30 in dem vorbereitenden Kapitel 0 der Vorlesung ist die Anzahl n der Möglichkeiten aus 20 verschiedenen Fächern zwei auszuwählen

$$n = \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190.$$

□