



Übungen zur Vorlesung Funktionalanalysis I
Wintersemester 2008/2009

Ferienübungsblatt
Abgabe: Keine Abgabe

Aufgabe 1

Sei K eine Teilmenge eines \mathbb{K} -Vektorraumes E . Wir definieren die absolut konvexe Hülle $\Gamma(K)$ von K durch

$$\Gamma(K) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i : x_1, \dots, x_n \in K, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} \text{ mit } \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \leq 1 \right\}.$$

Zeigen Sie, dass $\Gamma(K)$ die kleinste absolut konvexe Menge in E ist, welche K enthält.

Aufgabe 2

Sei E ein lokalkonvexer topologischer Vektorraum und seien $A, B, M_1, \dots, M_r \subset E$. Wir nennen $A \subset E$ beschränkt, wenn für alle Nullumgebungen U in E ein $\delta > 0$ existiert mit $A \subset \delta U$. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

- (a) Ist A beschränkt, so auch der Abschluss der absolut konvexen Hülle $\overline{\Gamma(A)}$ von A .
- (b) Ist A kompakt, so ist A beschränkt.
- (c) Sind M_1, \dots, M_r absolutkonvex, so folgt

$$\Gamma(M_1 \cup \dots \cup M_r) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i : \begin{array}{l} x_i \in M_i \text{ für } i = 1, \dots, r \text{ und} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K} \text{ mit } \sum_{i=1}^r |\alpha_i| \leq 1 \end{array} \right\}.$$

- (d) Sind M_1, \dots, M_r absolutkonvex und kompakt, so ist $\Gamma(M_1 \cup \dots \cup M_r)$ kompakt.
-

Aufgabe 3

Zeigen Sie, dass es für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ unendlich viele paarweise verschiedene maximale Ideale \mathcal{I} in der Banachalgebra $C_b(\mathbb{D})$ der stetigen und beschränkten Funktionen auf \mathbb{D} gibt mit

$$\{f \in \mathcal{R}; \tilde{f}(z) = 0\} \subset \mathcal{I}.$$

Hierbei sei \mathcal{R} die abgeschlossene Unter algebra aller auf \mathbb{D} beschränkten, stetigen Funktionen f , die eine stetige Fortsetzung \tilde{f} auf $\overline{\mathbb{D}}$ besitzen.

Bitte wenden!

Aufgabe 4

Sei $\emptyset \neq G \subset \mathbb{C}$ offen, sei $\mathcal{N} := \mathcal{N}(G)$ und sei

$$H^\infty(G) := \mathcal{O}(G) \cap L^\infty(G)$$

die Menge der beschränkten holomorphen Funktionen auf G . Zeigen Sie:

- (a) Durch $h \mapsto h + \mathcal{N}$ ist eine Einbettung von $H^\infty(G)$ in $L^\infty(G)$ gegeben mit

$$\|h + \mathcal{N}\|_\infty = \sup_{z \in G} |h(z)|.$$

Wir identifizieren $H^\infty(G)$ mit dem Bild dieser Einbettung.

- (b) Mit der Identifikation aus (a) ist $H^\infty(G)$ eine abgeschlossene Unteralgebra von $L^\infty(G)$.
-

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass unter den Voraussetzungen und mit den Bezeichnungen von Aufgabe 4 gilt:

- (a) Für alle $z \in G$ ist

$$\delta_z : H^\infty(G) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \delta_z(h) := h(z)$$

ein $\sigma(L^\infty(G), L^1(G))$ -stetiges Funktional auf $H^\infty(G)$.

- (b) $H^\infty(G)$ ist $\sigma(L^\infty(G), L^1(G))$ -abgeschlossen in $L^\infty(G)$.
-

Information:

- Um einen Leistungsnachweis zu erwerben, müssen Sie eine mündliche Prüfung ablegen. Zur Terminvereinbarung setzen Sie sich bitte mit Herrn Albrecht in Verbindung.
-

Die Übungsblätter finden Sie auch im Netz unter

www.math.uni-sb.de/~ag-albrecht/ws08_09/fa1/uebungen.html