

# Mathematik für Studierende der Biologie und des Lehramtes Chemie


Dominik Schillo

Universität des Saarlandes

9. Vorlesung, 22.12.2017  
(Stand: 22.12.2017, 13:23 Uhr)

Die einfachste Approximation einer Funktion  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  in einem Punkt  $a \in D$  ist die Approximation durch die konstante Funktion  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(a)$ .


Beispiel ( $a = 0$ )



# Motivation

Im Folgenden wollen wir („hinreichend gutartige“) Funktionen  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D \subseteq \mathbb{R}$  „lokal“ untersuchen, d. h. zu einem vorgegebenen Punkt  $a \in D$  wollen wir uns anschauen wie sich die Funktion  $f$  in einem kleinen Bereich um  $a$  verhält. Wir werden hierzu versuchen die (möglicherweise sehr komplizierte) Funktion durch einfache Funktionen anzunähern (zu „approximieren“).

Um eine Funktion in einem Punkt genauer approximieren zu können, müssen wir uns an die Steigung und Ableitung erinnern. Hierzu betrachten wir eine (affin) lineare Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a_0 + a_1 \cdot x$  mit  $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ .



Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto a_0 + a_1x$  ( $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ ) eine (affin) lineare Funktion. Die Rechnung

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a_0 + a_1(x+h) - (a_0 + a_1x)}{h} = a_1$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  und  $h \neq 0$  motiviert die folgende Definition.

### Definition

Die Steigung von  $f$  im Punkt  $x \in \mathbb{R}$  ist definiert durch

$$f'(x) = a_1.$$

### Bemerkung

Für eine (affin) lineare Funktion ist die Steigung also in jedem Punkt gleich.

Zu gegebenen  $a \in \mathbb{R}$  und  $h \neq 0$  ist die Sekante bzgl.  $a$  und  $a+h$  gegeben durch


$$s: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a) + f(a).$$

Die Tangente ergibt sich nun, wenn man  $h$  „immer kleiner macht“ (den Grenzwert für  $h$  gegen 0 bildet):

$$t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a) + f(a).$$

Damit der Grenzwert existiert, muss die Funktion  $f$  „schön genug“ sein.

Um die Steigung in einem Punkt für eine allgemeinere Funktion zu definieren zu können, betrachten wir **Sekanten** und schließlich die **Tangente**.



### Definition

Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $x \in \mathbb{R}$ . Wir nennen  $f$  differenzierbar in  $x$ , wenn der Differentialquotient

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

existiert. In diesem Fall nennen wir  $f'(x)$  die *Ableitung von  $f$  in  $x$* . Wir nennen  $f$  *differenzierbar*, falls  $f$  in jedem Punkt  $x \in \mathbb{R}$  differenzierbar ist. In diesem Fall nennen wir die Funktion

$$f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$$

die *Ableitung bzw. Ableitungsfunktion von  $f$* .

### Bemerkung

Wir betrachten manchmal auch den Fall, dass die Definitionsmenge ein Intervall ist (z.B.  $(0; \infty)$ ) oder wir einzelne Punkte rausnehmen (z.B.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ). Die Definition der Ableitung ist analog zur obigen.

Beispiel

1 Betrachte  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 5$  und sei  $x \in \mathbb{R}$ . Dann gilt

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5-5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0.$$

2 Betrachte  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$  und sei  $x \in \mathbb{R}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \end{aligned}$$

für alle  $h \neq 0$ , sodass

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Seien  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  zwei Funktionen und  $c \in \mathbb{R}$  sowie  $x \in \mathbb{R}$ .

Satz

Falls  $f$  und  $g$  in  $x$  differenzierbar sind, dann gilt:

- 1  $(c \cdot f)'(x) = c \cdot f'(x),$
- 2  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$  und  $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x),$
- 3  $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$
- 4  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2},$  falls  $g(x) \neq 0.$

Beispiel

3 Betrachte  $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$  und sei  $x \neq 0$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \frac{\frac{x - (x+h)}{(x+h)x}}{h} \\ &= \frac{-h}{(x+h)xh} \\ &= -\frac{1}{(x+h)x} \end{aligned}$$

für alle  $h \neq 0$  und  $h \neq -x$ , sodass

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{(x+h)x}\right) = -\frac{1}{x^2}.$$

Beispiel

1 Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$  und  $c = 3$ . Dann gilt

$$(3f)'(x) = 3f'(x) = 3 \cdot 2x = 6x$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

2 Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 4$  und  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 4x - 2$ . Dann gilt

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x) = 2 + 4 = 6$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

3 Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 4$  und  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ . Dann gilt

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = 2x^2 + (2x+4)2x = 6x^2 + 8x$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

**Beispiel**

4 Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$  und  $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ . Dann gilt

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} = \frac{2x \frac{1}{x} - x^2 \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{2 + 1}{\frac{1}{x^2}} = 3x^2$$

für alle  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

**Satz**

1 Seien  $c \in \mathbb{R}$  und  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto c$  sowie  $x \in \mathbb{R}$ . Dann gilt

$$f'(x) = 0.$$

2 Seien  $n \in \mathbb{N}^*$  und  $g_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n$  sowie  $x \in \mathbb{R}$ . Dann gilt

$$g_n'(x) = nx^{n-1}.$$

3 Seien  $m \in \mathbb{N}^*$  und  $h_m: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^{-m} = \frac{1}{x^m}$  sowie  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Dann gilt

$$h_m'(x) = -mx^{-m-1} = -\frac{m}{x^{m+1}}.$$

**Satz**

Falls  $g$  in  $x$  und  $f$  in  $g(x)$  differenzierbar sind, dann gilt

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Ist  $g = f^{-1}$  die Umkehrfunktion von  $f$ , so folgt insbesondere

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))},$$

falls  $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$  gilt.

**Beispiel**

Seien  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$  und  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x + 4$ . Dann gilt

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = 2(3x + 4) \cdot 3 = 18x + 24$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

**Beispiel**

1 Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 4$ . Dann gilt

$$f'(x) = 0$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

2 Sei  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^5$ . Dann gilt

$$g'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

3 Sei  $h: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x^3}$ . Dann gilt

$$h'(x) = -\frac{3}{x^{3+1}} = -\frac{3}{x^4}$$

für alle  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

**Folgerung**

Seien  $n \in \mathbb{N}$  und  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  reelle Zahlen. Wir nennen eine Funktion der Form

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k,$$

ein Polynom. Dann gilt

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} = \sum_{k=1}^n ka_kx^{k-1}$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

**Frage**

Sind die Funktionen  $\sin, \cos, \exp$  und  $\ln$  ebenfalls differenzierbar? Und falls ja, wie sehen ihre Ableitungen aus?

**Antwort**

Alle diese Funktionen sind auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar. Im Folgenden werden wir sehen wie die Ableitungen jeweils aussehen.

**Beispiel**

1 Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 5x^3 - 4x + 2$ . Dann gilt

$$f'(x) = 5 \cdot 3x^{3-1} - 4 \cdot 1x^{1-1} + 0 = 15x^2 - 4$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

2 Sei  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 10x^6 - 7x^5 - x^2$ . Dann gilt

$$g'(x) = 10 \cdot 6x^{6-1} - 7 \cdot 5x^{5-1} - 2x^{2-1} = 60x^5 - 35x^4 - 2x$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

Sinus und Cosinus

Wir untersuchen zunächst die Differenzierbarkeit von  $\sin$  im Punkt 0, d.h. wir untersuchen

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(0 + h) - \sin(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}.$$

Man kann sich geometrisch überlegen, dass

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$$

gilt

Als Nächstes wollen wir die Ableitung von  $\cos$  im Punkt 0 bestimmen, d. h.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(0 + h) - \cos(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{\cos(h) - 1}{h} &= \frac{(\cos(h) - 1)(\cos(h) + 1)}{h(\cos(h) + 1)} = \frac{\cos(h)^2 - 1}{h(\cos(h) + 1)} \\ &= -\frac{\sin(h)^2}{h(\cos(h) + 1)} = -\frac{\sin(h)}{h} \frac{\sin(h)}{\cos(h) + 1} \end{aligned}$$

für alle  $h \neq 0$ , sodass

$$\begin{aligned} \cos'(0) &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \frac{\sin(h)}{\cos(h) + 1} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{\cos(h) + 1} \\ &= -1 \cdot \frac{0}{1 + 1} = 0, \end{aligned}$$

da  $\cos(0) = 1, \sin(0) = 0$  (und  $\cos, \sin$  stetig sind).

Ebenfalls kann man sich mit Hilfe der Formel auf der letzten Folie

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  überlegen. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x + h) - \cos(x)}{h} &= \frac{\cos(x) \cos(h) - \sin(x) \sin(h) - \cos(x)}{h} \\ &= \cos(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \frac{\sin(h)}{h} \end{aligned}$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  und  $h \neq 0$ , sodass

$$\cos'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left( \cos(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \frac{\sin(h)}{h} \right) = -\sin(x)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt.

Man kann sich geometrisch überlegen, dass

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$$

für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x + h) - \sin(x)}{h} &= \frac{\sin(x) \cos(h) + \cos(x) \sin(h) - \sin(x)}{h} \\ &= \sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \end{aligned}$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  und  $h \neq 0$ , sodass

$$\sin'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \right) = \cos(x)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt.

**Satz (Ableitungen von  $\cos$  und  $\sin$ )**

Es gilt

$$\cos'(x) = -\sin(x) \quad \text{und} \quad \sin'(x) = \cos(x)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$ .

## Exponentialfunktion und Logarithmus

Um die Ableitung der Exponentialfunktion zu berechnen, ist wieder die Ableitung im Punkt 0

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(0+h) - \exp(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

entscheidend. Leider fehlen uns die Werkzeuge um diesen Grenzwert zu berechnen, da hier die Zahl  $e$  eine entscheidende Rolle spielt. Man kann

$$\exp'(0) = 1$$

zeigen. Für alle  $x \in \mathbb{R}$  folgt damit

$$\begin{aligned} \exp'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x)\exp(h) - \exp(x)}{h} \\ &= \exp(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = \exp(x). \end{aligned}$$

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



Da  $\ln$  die Umkehrfunktion von  $\exp$  ist, erhalten wir

$$\ln'(x) = \frac{1}{\exp'(\ln(x))} = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}$$

für alle  $x \in (0; \infty)$ .

### Satz (Ableitungen von $\exp$ und $\ln$ )

Es gilt

$$\exp'(x) = \exp(x)$$

für alle  $x \in \mathbb{R}$  und

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

für alle  $x \in (0; \infty)$ .