



Übungen zur Vorlesung Funktionalanalysis II
Sommersemester 2007

Blatt 3

Abgabetermin: Donnerstag, 17.05.2007

Aufgabe 11 (2+1+1=4 Punkte)

Seien E, F lokalkonvexe topologische Vektorräume. Für $i \in I$ sei $A_i : E \rightarrow F$ eine stetige lineare Abbildung.

- (a) Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:
- (i) Die Familie $(A_i)_{i \in I}$ ist punktweise beschränkt, das heißt für jedes $x \in E$ ist die Menge $\{A_i x; i \in I\}$ beschränkt in F .
 - (ii) Für jede Nullumgebung ist die Menge $\bigcap_{i \in I} A_i^{-1}(V)$ absorbierend in E .
- (b) Sei nun die Topologie auf E von einer vollständigen Metrik erzeugt. Die Familie $(A_i)_{i \in I}$ sei punktweise beschränkt. Zeigen Sie: Für jede abgeschlossene absolutkonvexe Nullumgebung $V \subset F$ ist $T = \bigcap_{i \in I} A_i^{-1}(V)$ eine Nullumgebung in E .
Hinweis: Es gilt $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nT$.
- (c) Welcher Satz aus der FA I ist damit bewiesen?

Aufgabe 12 (2+2+2=6 Punkte)

Sei (E, τ) ein Fréchetraum und d eine translationsinvariante Metrik auf E , die die Topologie τ erzeugt. Sei $F \subset E$ ein abgeschlossener Teilraum und τ_q die Quotiententopologie von τ auf E/F . Zeigen Sie:

- (a) Durch

$$\varrho([x], [y]) = \inf\{d(x - y, z); z \in F\} \quad (x, y \in E)$$

wird eine translationsinvariante Metrik ϱ auf E/F definiert.

- (b) Die Quotientenabbildung $q : (E, d) \rightarrow (E/F, \varrho)$ ist stetig und offen. Schließen Sie, dass die Topologie τ_q von ϱ erzeugt wird.
Hinweis: Es gilt $q(\{x \in E; d(x, 0) < \varepsilon\}) = \{u \in E/F; \varrho(u, 0) < \varepsilon\}$.
- (c) Der Raum $(E/F, \tau_q)$ ist ein Fréchetraum.
Hinweis: Vergleichen Sie mit dem entsprechenden Beweis im Fall von Banachräumen.

Aufgabe 13**(2+2=4 Punkte)**

Sei $T : E \rightarrow F$ eine lineare Abbildung zwischen lokalkonvexen Hausdorffräumen, $N \subset E$ ein linearer Teilraum mit $T|_N = 0$. Wir betrachten

$$\hat{T} : E/N \rightarrow F; \hat{T}[x] = Tx.$$

Zeigen Sie:

- (a) T ist stetig (offen) $\iff \hat{T}$ ist stetig (offen).
(b) Ist $\dim F < \infty$, so gilt: T ist stetig $\iff \ker T$ ist abgeschlossen.
-

Aufgabe 14**(4 Punkte)**

Sei E ein k -Vektorraum und $u : E \rightarrow k$ eine lineare Abbildung. Seien p_1, \dots, p_n Halbnormen auf E mit

$$|u(x)| \leq \sum_{i=1}^n p_i(x) \quad \text{für alle } x \in E.$$

Zeigen Sie: Es existieren lineare Abbildungen $u_1, \dots, u_n : E \rightarrow k$ mit $u = \sum_{i=1}^n u_i$ und $|u_i(x)| \leq p_i(x)$ für alle $x \in E$ und alle $i = 1, \dots, n$.

Hinweis: Betrachten Sie die Halbnorm $p : E^n \rightarrow \mathbb{R}; (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n p_i(x_i)$ und identifizieren Sie E mit einem geeigneten Teilraum von E^n .

Aufgabe 15***(4* Punkte)**

Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Eine Teilmenge $M \subset E_1 = \{x \in E; \|x\| \leq 1\}$ heißt *normierend für E'* , falls

$$\|u\| = \sup_{x \in M} |u(x)| \quad \text{für alle } u \in E'$$

gilt. Zeigen Sie: M ist normierend für E' $\iff \overline{\Gamma(M)} = E_1$.

Diese Übungsblätter können Sie sich auch über unsere Homepage besorgen:

<http://www.math.uni-sb.de/~ag-eschmeier/lehre>