Mathematik für Studierende der Biologie und des Lehramtes Chemie
Wintersemester 2013/14

Blatt 11

Abgabetermin: bis Freitag, den 17.01.2014, 12 Uhr

Aufgabe 1

(1,5+1+1,5=4 Punkte)

Eine Bakterienkultur besteht zu Anfang aus 1000 Bakterien. Die Anzahl der Bakterien verdoppelt sich alle 78 Minuten.

- (a) Die Anzahl der Bakterien zur Zeit t wird durch die Funktion

$$f(t) = C \cdot a^t$$

(näherungsweise) bestimmt. Die Zeit t soll dabei in Minuten angegeben werden. Bestimmen Sie a und C .

- (b) Wieviele Bakterien sind nach 20 Minuten bzw. nach 3 Stunden vorhanden?
(c) Wann wird sich die Anzahl der Bakterien verzehnfacht haben?
-

Aufgabe 2

(3×1=3 Punkte)

Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

- (i) $\log(x + 3) = 4 + \log(2x)$,
(ii) $7 \cdot 3^{5x} = 4^{x+1}$,
(iii) $2^{7x} = 5^{2x}$.
-

Aufgabe 3

(4×1,5=6 Punkte)

Untersuchen Sie, ob die folgenden Grenzwerte in $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ existieren (prüfen Sie zunächst die Approximierbarkeit!), und berechnen Sie sie gegebenenfalls:

- (a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 1}{x^3 + 1}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x + 4}$
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x) + \cos(x)}{x}$ (d) $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{\frac{x+1}{x}}$.
-

(bitte wenden)

Aufgabe 4

(4 Punkte)

Untersuchen Sie die folgende Funktion auf Stetigkeit:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} -\frac{3}{2} & \text{für } x \in (-\infty, -1) \\ 2 & \text{für } x = -1 \\ -x + 2 & \text{für } x \in (-1, 1) \\ 1 & \text{für } x = 1 \\ x^2 & \text{für } x \in (1, 2] \\ 2x + 3 & \text{für } x \in (2, +\infty) \end{cases}$$

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt monoton wachsend, falls für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x \leq y$ auch $f(x) \leq f(y)$ gilt.

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt streng monoton wachsend, falls für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x < y$ auch $f(x) < f(y)$ gilt.

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt periodisch, falls es ein $T > 0$ gibt mit $f(x) = f(x + T)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt gerade, falls $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Aufgabe 5

(1,5*+1,5*=3* Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nicht gleichzeitig periodisch und streng monoton wachsend sein kann.
- (b) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine gerade, monoton wachsende Funktion. Zeigen Sie, dass f konstant sein muss. (Hinweis: Zeigen Sie, dass $f(x) = f(0)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.)
-