Höhere Mathematik für Ingenieure III, Blatt 12

Aufgabe 1. (4+1 Punkte)

- i) Es sei $\mathbb{R}^3 \supset M = B_1(\mathbf{0}) - \{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : 0 < |\mathbf{x}| < 1\}$. Zu fixiertem $\alpha \in \mathbb{R}$ sei $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|^{-\alpha}$. Finden Sie eine reguläre Ausschöpfung von M und zeigen Sie, für welche α das uneigentliche Integral

$$\int_M f(\mathbf{x}) \, dV$$

konvergiert. Berechnen Sie das Integral, falls es konvergiert.

- ii) Kann das Integral

$$\int_{\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : |\mathbf{x}| > 1\}} \frac{e^{|\mathbf{x}|}}{|\mathbf{x}|} \, dV$$

konvergieren?

Aufgabe 2. (5 Punkte) Es sei γ die aus $\gamma^{(1)}$, $\gamma^{(2)}$, $\gamma^{(3)}$ zusammengesetzte stückweise glatte Kurve

$$\begin{aligned} \gamma^{(1)} : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \gamma^{(1)}(t) &= \begin{pmatrix} t^2 \\ -t^3 \end{pmatrix}, \\ \gamma^{(2)} : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \gamma^{(2)}(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ t-1 \end{pmatrix}, \\ \gamma^{(3)} : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \gamma^{(3)}(t) &= \begin{pmatrix} 1-t \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$M \subset \mathbb{R}^2$ sei der von γ berandete Normalbereich. Fertigen Sie eine Skizze an (Orientierung des Randes von M andeuten) und berechnen Sie den Flächeninhalt von M mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes in der Ebene.

Aufgabe 3. (5 Punkte) Es sei γ die aus $\gamma^{(1)}$ und $\gamma^{(2)}$ zusammengesetzte stückweise glatte Kurve, wobei

$$\begin{aligned} \gamma^{(1)} : [-2, 0] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \gamma^{(1)}(t) &= \begin{pmatrix} t \\ t(-t^2 - t + 2) \end{pmatrix}, \\ \gamma^{(2)} : [0, 2] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \gamma^{(2)}(t) &= \begin{pmatrix} -t \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Skizzieren Sie γ (Nullstellen der zweiten Komponente von $\gamma^{(1)}$ beachten) und berechnen Sie den Flächeninhalt der eingeschlossenen Menge mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes in der Ebene.

Bitte wenden.

Aufgabe 4. (5 Punkte) Im $\mathbb{R}^3$ sei M der Normalbereich mit Rand $\partial M = S^{(0)} \cup S^{(1)} \cup S^{(2)}$. Die Flächen $S^{(i)}$, $i = 1, 2, 3$, seien hierbei gegeben durch die Parametrisierungen

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \mapsto X^{(0)}(\underline{\mathbf{u}}) = \begin{pmatrix} \cos(u_1) \\ \sin(u_1) \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq u_1 \leq 2\pi, \quad 0 \leq u_2 \leq 1;$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \mapsto X^{(1)}(\underline{\mathbf{u}}) = \begin{pmatrix} u_1 \cos(u_2) \\ u_1 \sin(u_2) \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq u_1 \leq 1, \quad 0 \leq u_2 \leq 2\pi;$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \mapsto X^{(2)}(\underline{\mathbf{u}}) = \begin{pmatrix} u_1 \cos(u_2) \\ u_1 \sin(u_2) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq u_1 \leq 1, \quad 0 \leq u_2 \leq 2\pi.$$

Mit N sei der äußere Normalenvektor an ∂M bezeichnet. Fertigen Sie eine Skizze an. Berechnen Sie für das Vektorfeld $F(\underline{\mathbf{x}}) = \underline{\mathbf{x}}$

$$\int_{\partial M} \langle F, N \rangle \, dA.$$

Abgabe. Bis Do., 28.01.2010, Briefkasten am Eingang des Hörsaalgebäudes E2.5,
Leerung 8.30.

Die Übungsblätter finden Sie auch im Netz unter
<http://www.math.uni-sb.de/ag/fuchs/HMI3/hmi3.html>