Übungen zur Vorlesung
Operatoren auf dem Hilbertraum
(Wintersemester 2002/2003)

Blatt 1

Abgabetermin: Montag, 4.11.2002, vor der Vorlesung

Aufgabe 1 (Orthogonalität, Orthonormalbasen im Endlichdimensionalen)

Sei $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ eine endliche orthonormale Teilmenge des Skalarproduktraumes $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Für $x \in V$ setze man $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

- (a) Sei $x \in V$ beliebig. Zeigen Sie: Der Vektor $x' = x - \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle x_i$ ist orthogonal zu jedem x_j ($j = 1, \dots, n$). Folgen Sie: Für $x \in V$ gilt

$$\sum_{i=1}^n |\langle x, x_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (\text{Besselsche Ungleichung}).$$

- (b) Beweisen Sie unter Verwendung von Teil (a): Für $x, y \in V$ gilt die Ungleichung

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (\text{Schwarzsche Ungleichung}).$$

Rechnen Sie nach, dass durch $\|\cdot\|$ tatsächlich eine Norm auf V erklärt wird.

- (c) Zeigen Sie unter der Einschränkung $\dim V < \infty$ die Äquivalenz folgender Aussagen:

- (i) Es gibt keine Orthonormale Menge $S \subset V$ mit $X \subsetneq S$.
- (ii) Ist $\langle x, x_i \rangle = 0$ für alle $i = 1, \dots, n$, so folgt $x = 0$.
- (iii) $\text{span } X = V$
- (iv) Für jedes $x \in V$ ist $x = \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle x_i$.
- (v) Für alle $x, y \in V$ gilt $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle \langle x_i, y \rangle$ (Parsevalsche Identität).
- (vi) Für jedes $x \in V$ ist $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, x_i \rangle|^2$.

- (d) Zeigen Sie, dass jeder endlich-dimensionale Skalarproduktraum V eine Vektorraumbasis aus paarweise orthogonalen Vektoren der Norm 1 (Orthonormalbasis) besitzt.

Aufgabe 2 (Operatoren auf endlichdimensionalen Hilberträumen)

Sei V ein komplexer Skalarproduktraum mit $\dim V < \infty$ und $L(V) = \{A : V \rightarrow V, A \text{ ist linear}\}$ die Menge aller linearen Operatoren auf V . Beweisen Sie folgende Aussagen:

- (a) Zu jedem linearen Funktional $y' : V \rightarrow \mathbb{C}$ existiert ein Vektor $y \in V$ mit der Eigenschaft

$$y'(x) = \langle x, y \rangle \quad (x \in V).$$

- (b) Sei $A \in L(V)$. Dann gibt es genau einen Operator $A^* \in L(V)$ mit $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle$.

Man nennt A^* den adjungierte Operator von A . Im Falle $A = A^*$ heißt A selbstadjungiert.

- (c) Leiten Sie einige Rechenregeln für die Abbildung $*$: $L(V) \rightarrow L(V)$, $A \mapsto A^*$, her.

- (d) Sei $X = (x_1, \dots, x_n)$ eine Orthonormalbasis von V . Ist (a_{ij}) die darstellende Matrix von A bzgl. X , so ist $(\bar{a}_{ij})^t$ die darstellende Matrix von A^* bzgl. X . Es gilt $\det A^* = \det \bar{A}$.

- (e) Ein Operator $A \in L(V)$ ist genau dann selbstadjungiert (vgl. (b)), wenn für die darstellende Matrix (a_{ij}) bzgl. einer Orthonormalbasis X von V gilt: $a_{ij} = \bar{a}_{ji}$ ($i, j = 1, \dots, n$).

- (f) Man hat die Zerlegung $L(V) = L(V)_{sa} \oplus iL(V)_{sa}$, wobei $L(V)_{sa}$ den $\mathbb{R}$ -Vektorraum der selbstadjungierten Operatoren auf V bezeichnet.

- (g) Für $A \in L(V)$ gilt: $A = 0 \Leftrightarrow \langle Ax, x \rangle = 0$ für alle $x \in V$ und $A = A^* \Leftrightarrow \langle Ax, x \rangle \in \mathbb{R}$ für alle $x \in V$. (Hinweis: Berechnen Sie $\langle A(x + \lambda y), (x + \lambda y) \rangle$ für $x, y \in H$ und $\lambda \in \{1, -1, i, -i\}$; diese Technik nennt man *Polarisieren*.)

Aufgabe 3 (Isometrien im Endlichdimensionalen)

Über einem endlich-dimensionalen Skalarproduktraum V beweise man folgende Aussagen:

(a) Für $T \in L(V)$ sind äquivalent:

(i) $T^*T = \text{id}_V$

(ii) Für alle $x, y \in V$ gilt: $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$.

(iii) Für alle $x \in V$ ist $\|Tx\| = \|x\|$.

(Hinweis: Für (iii) $\Rightarrow$ (i) verwende man Aufgabe 2 (g).)

In diesem Fall nennt man T *isometrisch* bzw. eine *Isometrie*.

(Bemerkung: Im endlich-dimensionalen Fall ist jede Isometrie automatisch ein isometrischer Isomorphismus. In Skalarprodukträumen beliebiger Dimension ist diese Aussage jedoch falsch. Was kann „schiefgehen“?)

(b) Sei $X = (x_1, \dots, x_n)$ eine Orthonormalbasis von V und $U : V \rightarrow V$ ein isometrischer Isomorphismus. Dann ist auch $(Ux_1, \dots, Ux_n)$ eine Orthonormalbasis von V .

(c) Ein Operator $U \in L(V)$, der eine Orthonormalbasis X von V in eine Orthonormalbasis $U(X)$ von V überführt, ist ein isometrischer Isomorphismus.

Aufgabe 4 (Modellsatz für endlichdimensionale Hilberträume)

Seien $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ und $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ zwei Skalarprodukträume und $L(V, W) = \{A : V \rightarrow W, A \text{ linear}\}$. Ein Operator $T \in L(V, W)$ heißt isometrisch, falls für alle $x, y \in V$ gilt: $\langle Tx, Ty \rangle_W = \langle x, y \rangle_V$.

Zeigen Sie: Jeder n -dimensionale Skalarproduktraum V ist isometrisch isomorph zu $\ell^2(n)$. Hierbei steht $\ell^2(n)$ für den $\mathbb{C}^n$ – versehen mit dem Standard-Skalarprodukt: $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$ ($x, y \in \mathbb{C}^n$).

Konstruieren Sie einen isometrischen Isomorphismus $U : V \rightarrow \ell^2(n)$ unter Zuhilfenahme von Teil (d) der Aufgabe 1. Ein Blick auf Aufgabe 3 (b) hilft ebenfalls weiter.